



ACTUALITÉS PHYTOSANITAIRES EN GRANDES CULTURES

Juillet/Août 2010

Page 1 de 2

Betteraves

Cercosporiose, ramulariose, rouille et oïdium

Agora SC ou Proline

Selon contrôle dès mi-juillet. Alternier les produits. Selon nécessité, effectuer 2 à 3 traitements à intervalles de 4 semaines environ.

Pommes de terre

Mildiou, alternariose

Acrobat MZ

Lors d'une forte pression de la maladie ou en mélange avec **Mapro** pour traitements de stoppage selon conseils.

Dans les parcelles saines, assurer la protection jusqu'en fin de saison avec **Zetanil Combi** ou **Miros FL**.

Lors der mildiou tardif, effectuer le dernier traitement avec **Consento** en mélange avec le défanage chimique.

Défanage

Basta

Traitez au début de la sénescence. Aucune repousse et excellent effet herbicide. Miscible avec **Consento**. Uniquement sur pommes de terre de consommation. Sur fanes très développées, suite de traitement avec **Réglone** selon conseils.

Limaces, coïtrons

Metarol-Schneckenkorn

Epandre 10 à 14 jours avant le brûlage des fanes et répéter selon nécessité. Formulation «**longlife**» résistante au lessivage.

Colza – Préavis

Désherbage

Devrinol Top

L'herbicide à large spectre utilisable dès le semis jusqu'en post-levée précoce. Vente par Stähler Suisse SA.

Limaces, coïtrons

Metarol-Schneckenkorn

Epandre selon nécessité dès le semis jusqu'au stade cotylédons à 2 feuilles. Formulation «**longlife**» résistante au lessivage.

Altises (coléoptères + larves) et larves de tenthrèdes

Decis Protech

Traiter dès l'apparition des premiers dégâts. Respecter les directives PER. **Formulation EW**, respectant l'environnement.

Phoma, (pourriture du collet) + effet racourcisseur

Horizont EW 250

Le leader européen pour la protection fongique d'automne avec effet racourcisseur qui favorise la résistance à l'hivernage.

Céréales - Préavis

Désherbage d'automne contre graminées (agrostides, vulpins, raygras) et adventices dicotylédones (gaillets inclus)

Herold SC

Contre graminées et dicotylédones y compris les **agrostides résistantes** à d'autres produits. Idéal en post-levée précoce sur **orges, seigles, triticales** et semis hâtifs de blés.

Othello + Herold SC

Lors d'une forte pression de vulpins sur blés dès le stade 3 feuilles selon conseils Bayer. Efficace sur souches résistantes à IPU + FOP.

Vers fil de fer et pucerons vecteurs de la jaunisse nanisante

Smaragd FS 250

Sur parcelles menacées, utilisez des semences de céréales traitées. Seul produit autorisé contre la jaunisse nanisante sur orges.

Bayer (Schweiz) AG
CropScience
3052 Zollikofen
Tél. 031 869 16 66
www.bayercropscience.ch



Bayer CropScience

LE PARTENAIRE DE VOTRE CROISSANCE



ACTUALITÉS PHYTOSANITAIRES EN GRANDES CULTURES

Juillet/Août 2010

Page 2 de 2

Chaumes après céréales

Chiendents et autres vivaces

Glyfos

Le produit éprouvé à haute renommée. Traiter sur chiendents bien développés.
Miscible avec ***Effendi*** (Dicamba) ou 2,4-D contre rumex et liserons.

Nouveauté pour l'automne

Pommes de terre - Traitement des plants contre rhizoctone et galle argentée

Rhizoctone et galle argentée sur plantons de pommes de terre

Monceren Pro

Combinaison fongique avec Pencycuron et Prothioconazole. Hautement performant pour la désinfection des plants avant l'encavage ou la mise en caissette avec des pulvérisateurs appropriés.

Le traitement hâtif des plants en automne freine déjà le développement de la galle argentée au cours du stockage. Aussi autorisé pour les applications lors de la plantation.

