



## AKTUELLE EMPFEHLUNGEN FÜR DEN FELDBAU 2011

Juli/August

Seite 1 von 2

### Zucker- und Futterrüben

**Blattflecken, Rostarten und Mehltau**

***Agora SC oder Proline***

Gemäss Befallskontrolle ab ca. Mitte Juli. Produkte alternieren. Bei Bedarf 2 bis 3 Spritzungen in Abständen von ca. 4 Wochen durchführen.

### Kartoffeln

**Krautfäule, Alternaria-Blattflecken**

***Acrobat MZ***

Besonders bei starkem Krautfäuledruck oder für Abstoppspritzungen in **Mischung mit Mapro** gemäss Beratung.

In gesunden Beständen kann bis Saisonschluss **Zetanil Combi** oder das regenbeständige **Miros FL** eingesetzt werden.

Bei **Krautfäule-Spätbefall**, letzte Fungizidspritzung mit **Consento** in Mischung mit Stauden-Abbrennmittel durchführen.

**Abbrennen der Kartoffelstauden**

***Basta***

Auf **abreifende Stauden** spritzen. Kein Wiederaustrieb und starke Unkrautwirkung. Mischbar mit **Consento**. Nur bei Speisekartoffeln. Bei krautreichen Sorten, Spritzfolge mit **Reglone** gemäss Beratung möglich.

**Schnecken**

***Metarol - Schneckenkorn***

10 bis 14 Tage vor dem Vernichten der Stauden streuen und bei Bedarf nach 10 Tagen wiederholen. Regenbeständige **Longlife-Formulierung**.

### Raps -Vorschau

**Unkrautbekämpfung**

***Rodino Mit neuer Wirkstoffkombination!***

Neues Herbizid zur Unkrautbekämpfung im Voraufverfahren bis ca. 1 Woche nach der Saat. Breite Wirkung und gute Verträglichkeit.

**Schnecken**

***Metarol-Schneckenkorn***

Bei Bedarf unmittelbar nach der Saat vom Keim- bis 2-Blattstadium streuen. Regenbeständige **Longlife-Formulierung**.

**Erdflöhe (Käfer- und Larven) Blattwespenlarve**

***Decis Protech***

Beim Auftreten der ersten Frassschäden. ÖLN-Vorschriften beachten. **Umweltfreundliche EW-Formulierung**.

**Wurzelhälsfäule (Phoma), + Verkürzung**

***Horizont EW 250***

Der europäische Leader für den Fungizidschutz im Herbst. Gleichzeitiger **Verkürzungseffekt mit Verbesserung der Winterfestigkeit**.

### Getreide -Stoppelfelder

**Quecken und diverse mehrjährige Unkräuter**

***Glyphos***

Bewährtes Leaderprodukt. Mischbar mit **Effendi** (Dicamba) oder 2,4-D gegen Blacken und Winden.



## AKTUELLE EMPFEHLUNGEN FÜR DEN FELDBAU 2011

Juli/August

Seite 2 von 2

### Getreide - Vorschau

**Unkrautbekämpfung im Herbst gegen Ungräser** (Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Raygräser) und **dikotyle Unkräuter** (inkl. Klebern)

#### ***Herold SC***

Erfasst Ungräser und dikotyle Unkräuter, inklusiv **resistente Windhalmstämme**. Ideal für Behandlungen im Vor- oder **frühen Nachauflauf** in Gerste, Roggen, Triticale und Weizen-Frühsaaten.

#### ***Othello + Herold SC***

Bei sehr starkem Befall mit **Ackerfuchsschwanz in Winterweizen** ab 3-Blattstadium. Anwendung gemäss Bayer-Beratung. Erfasst auch IPU und FOP's resistente Stämme.

**Drahtwürmer, Blattläuse** (Überträger der Zwergvergilbung)

#### ***Smaragd 250 FS***

In gefährdeten Parzellen und Regionen, gebeiztes Getreidesaatgut verwenden. Einziges Produkt zur Vorbeugung der **Gelbverzwergung an Gerste**.

### Kartoffelsaatgut - Beizung gegen Rhizoctonia und Silberschorf

**Rhizoctonia und Silberschorf an Pflanzkartoffeln**

#### ***Monceren Pro***

Hochwirksame Fungizidkombination mit Pencycuron und Prothioconazol zur **Lagerbeizung von Pflanzkartoffeln** mit geeigneten Sprühgeräten.

Die **Herbstbeizung** verhindert schon die Ausbreitung des Silberschorfes während der Lagerung. Auch bewilligt für Anwendungen im Frühjahr bei der Pflanzung.